

## Diagnosen einiger neuer peruanischer Vögel\*).

Von

Dr. J. J. von Tschudi.

---

### 1. *Ampelis elegans.*

A. viridis; capite, cervice gulaque atro-virescentibus; gutture et pectore luteis; abdomine crissoque colore stramineo; rostro rubro; pedibus plumbeis.

Magnit. Ampel. viridis d'Orb.

Hab. ad flumen Tullumayo.

### 2. *Ampelis cincta.*

A. supra olivacea nigro variegata; remigibus primae ordinis nigris, subtus viridi-albescentibus; plumis abdominis subflavis fascia nigra cinctis; cauda apice flava; rostro pedibusque nigricantibus.

Magnit. Amp. elegant. major.

Hab. in sylvis Pangoae.

### 3. *Columba gracilis.*

C. capite coeruleo-griseo; dorso cinereo-fuscescente; auchenio dilutiore, tectricibus superioribus griseis, inferioribus nigris; remigibus primariis nigricantibus; parapteris fascia obliqua amethystino-resplendente et nonnullis maculis subrotundis atrovi-rescentibus metallice nitidis; rectricibus duabus intermediis dorso concoloribus, reliquis nigris; rostro basi sulphureo, apice nigro; pedibus rubris.

Magn. Col. Talpacoti aliquantulum minor.

Hab. in regionibus occidentalibus.

### 4) *Columba meloda.*

C. pileo griseo-fusco; regione ophthalmica et loris nudis azureis; facie cinerea, regione parotica macula oblonga nigra;

---

\*) In dem ornithologischen Theile meiner Fauna peruana werde ich die ausführlichen Beschreibungen und Abbildungen dieser Vögel liefern

collo postico et dorso olivaceo-griscis, colli lateribus aureo-  
renitentibus; remigibus primariis nigris, pogoniis externis albo-  
cinctis, secundariis cinereis parte externa alba; uropygio coe-  
ruleo-cinereo; collo antico dilute rufescente; abdomine et  
crisso laete cinereis; alarum caudaeque tectricibus inferioribus  
canis; rectricibus apice magis minusve albis; rostro nigro;  
pedibus rubris.

Longit. totalis  $11\frac{1}{2}$  — 12".

Hab. frequenter in regionibus calidis praecipue declivitatibus  
Antium occidentalis.

### 5) *Columba frenata.*

C. capite olivaceo-griseo; sincipite dilutiore; gula pure  
alba; deraeo laete cano; facie subtiliter cinereo-rufescente a  
parauchenio vitta nigra separata; regione auriculari macula ob-  
longa nigricante; auchenio amethystino renitente dorso ex oli-  
vaceo-brunnescente; remigibus supra nigricantibus, infra cine-  
reis; tectricibus caudaeque rufescentibus; rostro nigro; pedi-  
bus rubris.

Longit. 1' 3".

Hab. in sylvis Antium declivitatibus orientalis.

### 6) *Penelope rufiventris.*

P. pileo griseo-fusco; collo olivaceo; gula fusca; regione  
ophthalmica anteriore nigra, posteriore carnea; dorso uropy-  
gio et rectricibus aeneo-virescentibus nitidis; remigibus cha-  
lybeo-nigris, pogoniis externis renitentibus; tectricibus alarum  
superioribus griseo-terminatis, inferioribus nigricantibus; ab-  
domine, hypochondriis femoribus crissoque cinnamomeis; rostro  
colore corneo; pedibus rubris.

Longit. totalis 2' 2".

Hab. in sylvis Antium elevatis prope Chilpes.

### 7) *Penelope adspersa.*

P. capite fusco; regione ophthalmica nuda, nigra; gula nuda  
rubra; pectore planis fuscis, albo-terminatis; dorso ex oli-  
vaceo fusco vix renitente; remigibus aliquantulum cupreo-re-  
splendentibus; abdomine cano; hypochondriis, crisso, tectrici-  
bus alarum inferioribus cinnamomeis; rectricibus intermediis

atro-viridibus, chalybeo-nitidis, ceteris cinnamomeis; rostri apice subflavo, basi nigra; pedibus rubris.

Longit. tot. 1' 8".

Habit. frequenter in sylvis.

8. *Thinocorus Ingae*.

Th. sincipite cinereo; gula alba, vitta semicirculari nigra cineta; thoracice cano, abdomine pure albo fascia nigra separato; auchenio cinereo; plumis pilei ac dorsi nigris maculis fuscis cordiformibus, albo terminatis; remigibus supra nigris, infra griseis; alis parapterisque elongatis; tectricibus caudae dorso concoloribus licet dilutioribus; rectricibus nigris albo-terminatis; hypochondriis plumbeis; crisso albo; rostro culmine et apice nigris, lateribus flavis; pedibus flavis.

Long. totalis 7½".

Hab. in Antium montibus valde elevatis.

9. *Crypturus Kleei*.

C. pileo nigro punctulis albis adperso; gula albicante; plumis auchenii griseis, dorsi ex olivaceo fuscis totis fasciis nigris transverse striatis; parapteris ejusdem coloris maculis albis adpersis, remigibus supra nigris, subtus cinereis; tectricibus inferioribus obscure cinereis; abdomine plumis laxis, lineolis albis et nigris transversalibus innumerabilibus; crisso rufescente; maxilla superiore nigra, inferiore fusca; pedibus coeruleo-nigricantibus.

Long. totalis 1' 3".

Hab. apud flumen Chanchamayo et in Chunchotambo.

10. *Odontophorus speciosus*.

O. pileo plumis elongatis obscure fuscis; regionibus superciliaribus nigro- et albo-maculatis; gula aterrima; dorso fusco, lineolis obscuris transversalibus numerosis; plumarum scapo albo; remigibus nigris; parapteris nigro- et flavo-maculatis; crisso et uropygio dorso dilutioribus; pectore abdomineque cinnamomeis; rostro et pedibus nigris.

Long. totalis 10".

Hab. raro in sylvis apud flumina Aynamayo et Chanchomayo.

11. *Oedinenus superciliaris*.

Oe. supra ex pallide flavo fuscoque variegatus, subtus albescens; vitta nigra interna et alba externa supra oculos ad

occiput pertigentibus; remigum pogoniis externis et apicibus nigris, internis albis; rectricibus alarum inferioribus niveis, crisso rufescente, caudae apice nigro; rostro viridi, culmine nigro; pedibus virescentibus.

Long. totalis 1' 4".

Hab. in Oceani pacifici littoribus.

#### 12. *Charadrius Winterfeldti*.

Ch. capite, collo, dorso et alis nigro-fuscis maculis obscurioribus; remigibus primae ordinis nigris, secundae albo terminatis; campterii plumulis albis fusco-fasciatis; tectricibus inferioribus albis; pectore ex fusco cinereo, albido et nigro varioloso; gula albescente; abdomine crisso uropygioque niveis, griseo-maculatis; tectricibus nigris albo-terminatis; tuberculo pollicari parvulo; parte rostri antica nigerrima, postica flavescenti; pedibus viridibus.

Long. totalis 11".

Hab. in Oceani Magni littoribus.

#### 13. *Charadrius resplendens*.

Ch. capite collo et pectore cinereis; gula albicante; pectore, dorso parapterisque ex rufo fuscis viridi-nitidis; remigibus primae ordinis nigris, secundae albis; tectricibus superioribus amethystino resplendentibus; abdomine et crisso niveis; cauda alba, fusco-terminata; tuberculo pollicari mediocri; rostro sanguineo, apice nigro; pedibus rubris.

Long. totalis 10".

Antium incola.

#### 14. *Crex facialis*.

C. pileo dorsoque ex fusco olivaceis; facie cinerea; gula subrufa; pectore abdomineque ex cinereo rufescentibus; uropygio gulae colore; remigibus rectricibusque nigricantibus; tectricibus inferioribus rufescentibus; culmine rostri fusco, paratonis dilutioribus; mandibula subflava; pedibus fusco-flavescentibus.

Long. totalis 5 $\frac{1}{4}$ ".

Hab. raro in sylvis peruanis calidis.

#### 15. *Crex femoralis*.

C. pileo nigro; facie gula colloque cinereis, dorso olivaceo; parapteris cupreis; remigibus nigris, prima albo-cincta,

campterio albo; tectricibus inferioribus albis, maculis nigris disseminatis; abdomine ex brunneo cinereo; ventre et regione anali albicantibus; crisso nigerrimo; tectricibus inferioribus albis; hypochondriis femoribusque fuscis albo-maculatis; cauda nigra; maxillae basi et apice viridibus, medio virescente, maxillae apice flavo; pedibus coeruleo-viridibus.

Long. totalis 1'.

Hab. in sylvis apud flumen Tullumayo.

16. *Larus modestus*.

L. supra coeruleo-griseus; remigibus primariis nigris, secundariis concoloribus albo-terminatis; subtus aequaliter cinereus; rectricibus fascia transversa nigra albescente-terminatis; rostro nigro; pedibus nigerrimis.

Long. totalis 1' 3".

Hab. in Oceani pacifici littoribus.

17. *Fulica ardesiaca*.

F. cinerea, galea magna flava, occipite et collo nigris, dorso ardesiaco; abdomine dilutiore; remigibus nigricantibus, prima pogonio externo albo-terminata; rostro rubro, apice flavo; pedibus nigris.

Long. totalis 1' 10".

Hab. ad fluminum ripas et in Autium lacunis.

18. *Sterna acutirostris*.

St. alba, occipite et regione ophthalmica nigris, dorso et alis laete cinereis, remigibus bicoloribus, scapis albis; gula, pectore, abdomine et alarum latere interiore niveis; rectricibus externis cinereis, internis albis; rostro purpureo, apice colore corneo; pedibus rubris.

Long. totalis 10".

Habit. in Oceani pacifici littoribus.

19. *Sterna exilis*.

St. capite nigricante; dorso, alis et cauda obscure cinereis; pogonio remigum interno obscuriore, scapis fuscis; alarum tectricibus superioribus nigricantibus inferioribus griseis; gula thorace et crisso albis; rostro nigerrimo; pedibus nigris.

Long. totalis 7".

Hab. cum praecedente.

20. *Dysporus variegatus*.

D. capite, collo abdomineque albis; hypochondriis caudaque nigricantibus, albo variegatis; remigibus ex brunneo-nigris; rostro colore corneo; pedibus nigris.

Magnit. Dysp. sulae minor.

Hab. in littoribus et insulis Oceani pacifici.

21. *Anser montana*.

A. alba, alis atro-viridibus violaceo nitidis; rostro pedibusque rubris.

Longit. totalis 1' 10" — 2' 2".

Hab. in lacunis et palustribus montium frigidissimorum.

22. *Anas leucogenis*.

A. capite nigro utrimque linea alba cincto; genis colloque albis; pectore nigro, griseo-adserso; dorso fusco, nigro-striato; abdomine rufescente albo-striato; remigibus primariis nigris, secundariis viridi-nitidis; cauda longa rigida; rostro apice corneo culmine nigro; pedibus rubicundis.

Long. totalis 9".

Hab. in Antibus elevatis.

## Zur Naturgeschichte der *Mantis carolina*.

Aus einem Schreiben des Herrn Chr. Zimmermann  
mitgetheilt vom Herausgeber.

In einem Briefe vom 4. Juni v. J. aus Rockingham in Nord-carolina hat sich Hr. Zimmermann gegen mich weiter über das Amphibienfressen der *Mantis carolina* ausgesprochen, in Bezug darauf, dass ich frühere von ihm herrührende Nachrichten über diesen Gegenstand als *Mystification* bezeichnet hatte\*). Wenn mein Freund mir meinen Unglauben an seiner Erzählung verweist, und durch folgende nähere Mittheilungen seine früheren Angaben bekräftigen will, sieht er mindestens die Sache aus

\*) Dies. Arch. V. Jahrg. 2r. Bd. S. 347.